

# COVID-19 : Quand se faire dépister ?

## CAS 0



Symptomatique :  
Dépistage **IMMÉDIAT**




Asymptomatique :  
Test positif suite à  
un dépistage

**Isolement à domicile  
au moins 10j**

## CAS CONTACT FAMILLE


vie sous le même toit  
que le cas 0



**Isolement à domicile au moins 17j**


Test antigénique **IMMÉDIAT**  
2ème dépistage + **17J**  
(soit 7j après la fin  
d'isolement du malade)

## FIN DE L'ISOLEMENT




### Symptomatiques

**48h** après la fin de la fièvre  
et au minimum 10J après  
l'apparition de symptômes  
(pas de 2e test)



### Asymptomatiques

**10J** après le test  
(pas de 2e test)




### Famille non malade

**7J** après guérison du malade  
(soit au minimum 17J)

## CAS CONTACT (TRAVAIL, ...)

en contact avec le cas 0  
symptomatique dans les **48h**  
avant ses symptômes

en contact avec le cas 0  
asymptomatique dans les  
**7J** avant son test



**Isolement à domicile au moins 7j**

Test antigénique **IMMÉDIAT**  
2ème dépistage + **7J**

**Collègue non malade**  
**7J** après le dernier contact