

## Réaction d'hypersensibilité immédiate suite à une vaccination

### → DIAGNOSTIC :

- ▶ **Œdème de QUINCKE** : C'est une Urgence ++, surtout si accompagné d'un état de choc, associé ou non avec un bronchospasme
- ▶ **Choc Anaphylactique** : Sensation de malaise, hypotension artérielle pouvant entraîner une perte de connaissance, tachycardie > 120/mn, pouls filant, marbrures, polypnée

### → CONDUITE A TENIR :

- ▶ Allonger immédiatement la personne et la rassurer en tenant compte de son degré de conscience, demi assise si signes respiratoires, dos à plat et jambes surélevées si pas de signes respiratoires
- ▶ Appeler ou faire appeler un Médecin du Travail du centre
- ▶ Faire appeler le SAMU : 15 en précisant bien le motif
- ▶ Prendre les constantes de la personne : pouls, TA et surveiller le degré de conscience (à surveiller toutes les 2 minutes)
- ▶ Sur consignes du médecin coordinateur du SAMU ou du Médecin du Travail du centre : injection ANAPEN 0.3mg/0.3 ml en IM face antéro-externe de la cuisse. (Cf. protocole d'administration de l'Anapen)
- ▶ Suivre les consignes du médecin coordinateur du SAMU
- ▶ Surveiller la personne jusqu'à l'arrivée des secours

### → ORIENTATION :

- ▶ Vers les Services d'Urgences sur intervention du SAMU (15)

Date :

Signature MT

Signature IDEST